

التمرين 7

نضع : $z_A = -2i$ و $z_C = \sqrt{3} + i$

1. حدد الشكلي المثلثي للعددين z_C و z_A

2. بين أن : $\left(\frac{z_A z_C}{4}\right)^{2010} = 1$

3. نعتبر في المستوى العقدي النقط $A(z_A)$ و $B(z_0)$

و $C(-2\sqrt{3})$

أ- حدد الشكلي المثلثي للعدد : $\frac{z_A + 2\sqrt{3}}{z_A - z_B}$

ب- استنتج طبيعة المثلث ABC

التمرين 8

نعتبر في المستوى العقدي النقط $A\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ و

$B\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$ و $C\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$

1. بين أن : $AB = AC = \sqrt{2}$

2. حدد قياس الزاوية : $(\widehat{AB; AC})$

3. استنتج طبيعة المثلث ABC

التمرين 9

نعتبر في المستوى العقدي النقط $A\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right)$ و

$B\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)$ و $C\left(\sqrt{3} - \frac{1}{2}i\right)$

1. بين أن النقط A و B و C مستقيمية

2. أكتب z_A و z_B على الشكل المثلثي

3. أحسب $z_A^{60} + z_B^{60}$

التمرين 10

ليكن z عددا عقديا بحيث : $z^2 \neq 1$. نضع $Z = \frac{z}{z^2 - 1}$

1. بين أن $Z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow (z + \bar{z})(|z|^2 - 1) = 0$

2. حدد مجموعة النقط $M(z)$ بحيث : $Z \in i\mathbb{R}$

التمرين 11

حدد الشكل الجبري للأعداد التالية :

$5e^{-i\frac{\pi}{2}}$; $2e^{-i\frac{\pi}{3}}$; $\left(3e^{-i\frac{\pi}{6}}\right)^{48}$

التمرين 1

ليكن z عددا عقديا بحيث : $z \neq -\frac{i}{2}$

نضع : $Z = \frac{z + 2i}{2z + i}$

1. عبر عن \bar{Z} بدلالة \bar{z}

2. بين أن : $|Z| = 1 \Leftrightarrow |z| = 1$

3. حدد مجموعة النقط $M(z)$ بحيث : $|Z| = 1$

التمرين 2

نعتبر في المستوى العقدي النقط $A(1 + 3i)$ و $B(3 + i)$

و $C(1 - i)$

1. أحسب $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$

2. استنتج طبيعة المثلث ABC

التمرين 3

نعتبر في المستوى العقدي النقط $A(i)$ و $B(z)$ و $C(iz)$

حدد العدد العقدي z بحيث تكون النقط A و B و C مستقيمية

التمرين 4

نعتبر في المستوى العقدي النقط $A(2i)$ و $B(1 - 3i)$

و $C(m - i)$ حيث $(m \in \mathbb{R})$

1. أكتب بدلالة m الشكل الجبري للعدد : $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$

2. حدد قيمة العدد m كي تكون النقط A و B و C مستقيمية

3. حدد العدد m كي يكون ABC مثلث قائم الزاوية في C

التمرين 5

ليكن z عددا عقديا بحيث : $z \neq -1$. نضع $Z = \frac{z^2}{z + 1}$

1. بين أن : $Z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (z - \bar{z})(z\bar{z} + z + \bar{z}) = 0$

2. حدد مجموعة النقط $M(z)$ بحيث : $Z \in \mathbb{R}$

التمرين 6

حدد الرمز الأسّي للعدد العقدي z في الحالات التالية :

$z = 2 - 2i$; $z = 1 - i\sqrt{3}$; $z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

$z = (\sqrt{3} - i)^4$; $z = \frac{(2 + 2i)}{1 - i\sqrt{2}}$; $z = (1 + i)(-1 + i)\sqrt{3}$