

# طاقة النواة

## I. التكافؤ كتلة-طاقة

### • طاقة الكتلة

تمثل الكتلة شكلا من أشكال الطاقة يسمى طاقة الكتلة.  
طاقة الكتلة هي الطاقة التي يتوفر عليها كل جسم - حتى ولو كان في سكون-

خاصية

$$E = mc^2 \quad (\text{J})$$

بسبب كتلته فقط و تعبيرها:  
حيث  $c$  سرعة انتشار الضوء:

$$c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$$

- إذا كان الجسم في حركة فإنه يتوفر علاوة على ذلك، على طاقة حركية.  
- يترتب عن هذه العلاقة أن كل تغير يحصل في طاقة مجموعة يقابله تغير في كتلتها، والعكس

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

صحيح.العلاقة بين التغيرين هي:

على السلم الذري أو النووي يعبر عن الطاقة بوحدة مناسبة تسمى "الإلكترون - فولط" (eV)

$$1 \text{ eV} = 1,6.10^{-19} \text{ J}$$

أو مضاعفها "الميغا إلكترون - فولط" (MeV):

$$1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$$

**مثال:** طاقة الكتلة لبروتون كتلته  $m_p = 1,673.10^{-27} \text{ kg}$  هي:

$$E = 1,673.10^{-27} \times (3.10^8)^2 = 1,5.10^{-10} \text{ J}$$

$$E = \frac{1,5.10^{-10}}{1,6.10^{-13}} = 937,5 \text{ MeV}$$

## II. طاقة الربط لنواة

### • النقص الكتلي

تجريبيا يلاحظ أن كتلة نواة الذرة هي دائما أصغر من مجموع كتل النويات المكونة لها.

الفرق بينهما يسمى النقص الكتلي للنواة، و تعبيره:

$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - m_X$$

حيث:  $m_X$ : كتلة النواة،  $m_p$ : كتلة بروتون،  $m_n$ : كتلة نوترون.



$$\Delta m > 0$$

على السلم الذري أو النووي يعبر عن الكتلة بوحدة مناسبة تسمى "وحدة الكتلة الذرية" (u):

$$1u = \frac{1}{12} \times m\left({}^{12}_6\text{C}\right) = \frac{M\left({}^{12}_6\text{C}\right)}{12 \times N_A} = 1,66054.10^{-27} \text{ kg}$$

• **مثال:** النقص الكتلي لنواة الهليوم  ${}^4_2\text{He}$  هو:  $\Delta m = 5,038 \cdot 10^{-29} \text{ Kg}$

$$\Delta m = \frac{5,038 \cdot 10^{-29}}{1,66054 \cdot 10^{-27}} = 0,03034 \text{ u} \quad \text{أي:}$$

$$1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} / c^2$$

تستعمل أيضا وحدة أخرى للكتلة و هي  $\text{MeV} / c^2$  بحيث:


### • طاقة الربط لنواة

هي الطاقة اللازم منحها لنواة في حالة سكون لتفتيتها إلى نويات منفصلة و في

**تعريف**

$$E_\ell = \Delta m \cdot c^2$$

سكون. و تعبيرها هو:



عكسيا حين تتكون نواة انطلاقا من نويات منفصلة تتحرر الطاقة  $E_\ell$ . 

• **مثال:** طاقة الربط لنواة الهليوم  ${}^4_2\text{He}$  هي:

$$E_\ell = 0,03034 \times 931,5 = 28,26 \text{ MeV}$$

### • طاقة الربط لنوية

$$\frac{E_\ell}{A}$$

هي طاقة الربط المتوسطة لنوية و تساوي النسبة التالية:

**تعريف**

طاقة الربط لنوية تمثل الطاقة الضرورية لانتزاع نوية واحد من النواة. 

و تستعمل لمقارنة النويدات من حيث استقرارها: كلما كانت مرتفعة كلما كانت النواة مستقرة أكثر.

• **مثال:**

$$\frac{E_\ell}{A} = \frac{492}{56} = 8,79 \text{ MeV} / \text{nucléon} \quad \leftarrow \quad E_\ell = 492 \text{ MeV} \quad \text{هي: } {}^{56}_{26}\text{Fe} \text{ النواة الحديد}$$

$$\frac{E_\ell}{A} = \frac{1802}{238} = 7,57 \text{ MeV} / \text{nucléon} \quad \leftarrow \quad E_\ell = 1802 \text{ MeV} \quad \text{هي: } {}^{238}_{92}\text{U} \text{ النواة اليورانيوم}$$

نواة الحديد 56 أكثر استقرارا من نواة اليورانيوم 238.


### • منحنى "أسطون"

تتغير طاقة الربط المتوسطة لنوية بدلالة عدد الكتلة A للنواة.

يمثل منحنى أسطون تغيرات مقابل طاقة الربط المتوسطة لنوية بدلالة عدد الكتلة.

في هذا المنحنى الحالة المرجعية للطاقة ( $E=0$ ) هي حالة نويات منفصلة و في سكون.

يوافق أكبر استقرار القيمة الدنيا للمنحنى أي القيمة القصوى لطاقة الربط المتوسطة لنوية.



### أهمية المنحنى:

- يمكن المنحنى من مقارنة النويدات من حيث استقرارها:
- في المجال  $40 \leq A \leq 190$  تقع النويدات المستقرة التي لها طاقة ربط متوسطة عليا:  $E_b/A \approx 8 \text{ MeV / nucléon}$
- على طرفي المبيان تقع النويدات الأقل استقرارا و هي نوعان:
  - نويدات ثقيلة يمكنها أن تنشط إلى نواتين أخف منها و أكثر استقرارا مع تحرير طاقة.
  - نويدات خفيفة يمكنها أن تدمج لتعطي نويدة أثقل منها مع تحرير طاقة.

## III. الانشطار و الاندماج النووي


### • الانشطار النووي

هو تفاعل نووي محرّض خلاله تنقسم نواة ثقيلة و قابلة للانشطار إلى نواتين خفيفتين وذلك تحت تأثير اصطدامها بنوترون حركية لا تتعدى  $0,1 \text{ MeV}$  ( ما يسمى بنوترون حراري ). هذا التفاعل ناشر للطاقة.

تعريف

### • انشطار اليورانيوم 235

يعتبر اليورانيوم 235 النوية الطبيعية الوحيدة القابلة للانشطار و معادلة الانشطار العامة هي:



عموما العدد k يتراوح بين 1 و 3 نوترونات.

$$\begin{cases} A_1 + A_2 + k = 236 \\ Z_1 + Z_2 = 92 \end{cases}$$


قانونا الانحفاظ يفرضان العلاقتين التاليتين:

مثال:



### • التفاعل المتسلسل

يمكن للنوترونات المنبعثة خلال انشطار أن تحدث بدورها انشطار نوى أخرى. إذا كان عدد النوترونات المنبعثة خلال كل انشطار أكبر من 1 فإنه يحدث تفاعل متسلسل.




## • الاندماج النووي

### تعريف

هو تفاعل نووي محرّض خلاله تندمج نواتان خفيفتان فتنج نواة أثقل.  
و هو تفاعل ناشر للطاقة.  
هذا التفاعل لا يحدث إلا عند درجة حرارة مرتفعة جدا ( $10^8$  K) لذلك فهو يسمى تفاعلا نوويا حراريا.

• **مثال:** اندماج نظائر الهيدروجين الذي هو مصدر طاقة الشمس:




## IV. حصيلة الكتلة و الطاقة

### • الطاقة التي يحررها تفاعل نووي

• تعبيرها باستعمال تناقص الكتلة

الطاقة التي يحررها تفاعل نووي معادلته:



توافق تناقص الكتلة الإجمالية  $\Delta m$  للمجموعة و تعبيرها هو:


$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

حيث:

$$\Delta m = (m_{X_3} + m_{X_4}) - (m_{X_1} + m_{X_2})$$

👉  $\Delta m < 0 \leftarrow \Delta E < 0$ : المجموعة تحرر(تفقد) طاقة.

• **مثال:** لنحسب الطاقة التي يحررها تفاعل الاندماج ذو المعادلة:



معطيات:  $m_n = 1,009 \text{ u} / m_{{}^4_2\text{He}} = 4,003 \text{ u} / m_{{}^3_1\text{H}} = 3,016 \text{ u} / m_{{}^2_1\text{H}} = 2,014 \text{ u}$

تناقص الكتلة الإجمالية هو:


$$\Delta m = (m_{{}^4_2\text{He}} + m_n) - (m_{{}^2_1\text{H}} + m_{{}^3_1\text{H}}) = -0,018 \text{ u}$$

و الطاقة المحررة هي:

$$\Delta E = -0,018 \times 931,5 \approx -17 \text{ MeV}$$

التفاعل ينشر طاقة تساوي 17 MeV عن كل نواة هليوم ناتجة.

## • تعبيرها باستعمال طاقات الربط



من هذا المخطط نستنتج ما يلي:



هي:  $\Delta E = [E_l(X_1) + E_l(X_2)] - [E_l(X_3) + E_l(X_4)]$



معطيات: طاقة الربط المتوسطة لنوية للنويدات:

$$\frac{E_l}{A}({}^4_2\text{He}) = 7,0 \text{ MeV / nucléon} \quad / \quad \frac{E_l}{A}({}^3_1\text{H}) = 2,8 \text{ MeV / nucléon} \quad / \quad \frac{E_l}{A}({}^2_1\text{H}) = 1,2 \text{ MeV / nucléon}$$

الطاقة المحررة هي:  $\Delta E = E_l({}^2_1\text{H}) + E_l({}^3_1\text{H}) - E_l({}^4_2\text{He})$

$$\Delta E = (2 \times 1,2) + (3 \times 2,8) - (4 \times 7) \approx -17 \text{ MeV}$$

## • أشكال الطاقة المحررة

تظهر الطاقة التي يحررها تفاعل نووي على الأشكال التالية:

- طاقة حركية للنواتج (معظمها يتحول إلى طاقة حرارية)
- طاقة إشعاعية (طاقة الإشعاع  $\gamma$ )