

نشاط معيار التطور التلقائي

يكون حمض الإيثانويك $CH_3COOH_{(aq)}$ و أيون الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$ مزدوجة قاعدة/حمض ، ويكون حمض الميثانويك $HCOOH_{(aq)}$ و أيون الميثانوات $HCOO^-_{(aq)}$ كذلك مزدوجة قاعدة/حمض

نعطي عند $25^\circ C$: $K_{A_1}(HCOOH/HCOO^-)=1,6.10^{-4}$ و $K_{A_2}(CH_3COOH/CH_3COO^-)=1,6.10^{-5}$

1. أكتب معادلة التفاعل بين حمض الميثانويك $HCOOH_{(aq)}$ و أيون الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$.

2. بين أن ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل المزدوجتين هي: $K = (K_{A_1}/K_{A_2})$ ، احسب قيمة K .

نمزج في ثلاثة كؤوس A و B و C محلول حمض الميثانويك و محلول ميثانوات الصوديوم و محلول حمض الإيثانويك و محلول إيثانوات الصوديوم ، المحاليل الأربعة لها نفس التركيز $C = 10^{-1} mol.l^{-1}$ و ذلك حسب الحجم المبينة في الجدول حيث :

C	B	A	الكأس
1	5	10	$V_1(ml)$
1	10	10	$V_2(ml)$
10	20	10	$V_3(ml)$
1	1	10	$V_4(ml)$
3,8	3,7	4,2	pH عند التوازن

V_1 : حجم محلول حمض الميثانويك

V_2 : حجم محلول ميثانوات الصوديوم

V_3 : حجم محلول حمض الإيثانويك

V_4 : حجم محلول إيثانوات الصوديوم

نقيس pH في كل كأس وندون النتائج في الجدول ذاته.

بالنسبة للمجموعات الثلاث A و B و C .

3. أحسب في الحالة البدئية قيمتي

النسبتين $[CH_3COO^-]_i/[CH_3COOH]_i$ و $[HCOO^-]_i/[HCOOH]_i$ و استنتج قيم $Q_{r,i}$

4. عبر عند التوازن عن النسبتين $[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}/[CH_3COOH]_{\acute{e}q}$ و $[HCOO^-]_{\acute{e}q}/[HCOOH]_{\acute{e}q}$ بدلالة

$[H_3O^+]_{\acute{e}q}$ و K_A . أحسب هاتين النسبتين

5. استنتج قيمة خارج التفاعل في الحالة النهائية $Q_{r,f} = Q_{r,\acute{e}q}$.

6. ماذا يمكن أن نستنتج من مقارنة قيمة $Q_{r,i}$ مع ثابتة التوازن K بخصوص تطور المجموعة.

نشاط معيار التطور التلقائي

يكون حمض الإيثانويك $CH_3COOH_{(aq)}$ و أيون الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$ مزدوجة قاعدة/حمض ، ويكون حمض الميثانويك $HCOOH_{(aq)}$ و أيون الميثانوات $HCOO^-_{(aq)}$ كذلك مزدوجة قاعدة/حمض

نعطي عند $25^\circ C$: $K_{A_1}(HCOOH/HCOO^-)=1,6.10^{-4}$ و $K_{A_2}(CH_3COOH/CH_3COO^-)=1,6.10^{-5}$

1. أكتب معادلة التفاعل بين حمض الميثانويك $HCOOH_{(aq)}$ و أيون الإيثانوات $CH_3COO^-_{(aq)}$.

2. بين أن ثابتة التوازن المقرونة بتفاعل المزدوجتين هي: $K = (K_{A_1}/K_{A_2})$ ، احسب قيمة K .

نمزج في ثلاثة كؤوس A و B و C محلول حمض الميثانويك و محلول ميثانوات الصوديوم و محلول حمض الإيثانويك و محلول إيثانوات الصوديوم ، المحاليل الأربعة لها نفس التركيز $C = 10^{-1} mol.l^{-1}$ و ذلك حسب الحجم المبينة في الجدول حيث :

C	B	A	الكأس
1	5	10	$V_1(ml)$
1	10	10	$V_2(ml)$
10	20	10	$V_3(ml)$
1	1	10	$V_4(ml)$
3,8	3,7	4,2	pH عند التوازن

V_1 : حجم محلول حمض الميثانويك

V_2 : حجم محلول ميثانوات الصوديوم

V_3 : حجم محلول حمض الإيثانويك

V_4 : حجم محلول إيثانوات الصوديوم

نقيس pH في كل كأس وندون النتائج في الجدول ذاته.

بالنسبة للمجموعات الثلاث A و B و C .

1. أحسب في الحالة البدئية قيمتي

النسبتين $[CH_3COO^-]_i/[CH_3COOH]_i$ و $[HCOO^-]_i/[HCOOH]_i$ و استنتج قيم $Q_{r,i}$

2. عبر عند التوازن عن النسبتين $[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}/[CH_3COOH]_{\acute{e}q}$ و $[HCOO^-]_{\acute{e}q}/[HCOOH]_{\acute{e}q}$ بدلالة

$[H_3O^+]_{\acute{e}q}$ و K_A . أحسب هاتين النسبتين

3. استنتج قيمة خارج التفاعل في الحالة النهائية $Q_{r,f} = Q_{r,\acute{e}q}$.

ماذا يمكن أن نستنتج من مقارنة قيمة $Q_{r,i}$ مع ثابتة التوازن K بخصوص تطور المجموعة.