النشاط 0: مدخل الى الخبر الوراثي

الوضعية

التقيت بصديقك فأخبرك أن خبرا غريبا انتشر في المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده أن سيدة أنجبت أرنبا في برشيد حيث توجهت الى مشفى عمومي، وقالت إنها تعاني اَلام المخاض، وتم نقلما الى غرفة الولادة، ثم طلبت الذهاب الى الحمام وخرجت منه بعد عدة دقائق وهي تحمل جنيناً ميتاً بين يديما يشبه الأرنب الى حد كبير، وقالت إنها اجهضت!

أصر صديقك أن الأمر ممكن لأننا أصبحنا نسمع كثيرا من الأخبار عن ولادات غريبة هذه الأيام ولعل ذلك من علامات الساعة! لكنك لم تقتنع بصحة الخبر وأردت أن تثبت لصديقك أنه علميا غير ممكن فقدمت له الوثائق التالية:



الأسناد

الوثيقة 1:


يتوفر كل كائن حي على مجموعة من الخصائص تميز مظهره أو وظائف جسمه تسمى الصفات. من بين هذه الأخيرة تلك التي تنتقل من جيل لآخر وتسمى الصفات الوراثية كلون العيون والبشرة (الشكل أ) بينما هناك صفات تنحصر في بعض الأفراد ولا تنتقل من جيل لاَخر كنمو العضلات عند الرياضي (الشكل ب) او تغير لون البشرة نتيجة تعرضما للشمس.



الشكل ب

الشكل أ

تحتوى كل خلية على مجموعة محددة من الصبغيات فبالنسبة للإنسان نجد 46 صبغي، وعند الكلاب 76 والقطط 38 والأرانب 44 لكن بالنسبة للأمشاج (الحيوانات المنوية والبويضات) فنجد نصف عدد الصبغيات (23 صبغي عند الانسان). تحمل الصبغيات قطع صغيرة جدا تسمى المورثات بحيث كل مورثة تكون مسؤولة عن ظهور صفة وراثية محددة.




المورثات في الصبغي

12 18 X

الخريطة الصبغية لخلية عادية عند الرجل

الوثيقة 3:

تنتقل الصفات الوراثية من الآباء للأبناء عبر الأمشاج فبعد تشكل كل من المشيج الذكرى والأنثوى بحيث يحمل كل واحد منهما نصف الدخيرة الوراثية يحدث بينهما إخصاب فتتشكل البيضة التي يصبح عندها 46 صبغي والتي تتعرض لسلسلة من الانقسامات لتعضي فرد له صفات وراثية من أبيه و أمه.



مورثة 22

التعليمات


باستغلالك معطيات الوثائق أعلاه ومكتسباتك،

- بین لماذا پتمیز کل کائن بحی بصفات معینة پنقل لإبناءه؟
- وضح كيف ينقل الآباء صفاتهم لأبناءهم؟ ولماذا لا يرث إبن رياضي كمال الأجسام نفس حجم عضلات أبيه؟ .2
 - هل يمكن حقا أن نتجب امرأة أرنبا؟علل إجابتك .3
- تمكن علماء الوراثة من أخد بكتيريات عادية وجعلوها تصبح قادرة على إفراز الأنسولين علما أن هذا الأخير تفرزه عادة الخلايا eta الموجودة في البنكرياس، ماهي في نظرك الطريقة التي تم بها الحصول على تلك البكتيريات؟

النشاط 1: الكشف عن تموضع الخبر الوراثي

عند الكائنات الحية متعددة الخلايا والتي تعتمد التوالد الجنسي كالإنسان مثلا، ينحدر كل فرد من خلية واحدة أصلية وهي البيضة تعرضت بعد ذلك لسلسلة من الانقسامات الم أن يتشكل الكائن حاملا لصفاته الوراثية (الشكل، اللون...) فأين تتواجد المعلومات الوراثية (الخبر الوراثي) المسؤول عن ظمور الصفات الوراثية؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقترح دراسة معطيات الوثائق التالية:

★ تجربة التقطيع: نقوم بالتقطيع الدقيق لحيوان وحيد الخلية مثل الأميبة L'amibe كما هو مبين على الرسوم التالية:





الوثيقة 2


يعتبر Acetabularia طحلبا وحيد الخلية بالرغم من كبر حجمه الذي قد يصل إلى 8cm . و يتكون من ساق ووبر جذري مثابة دعامته التي يتثبت بها على الصخور. و توجد نواة هذه الخلية داخل الوبر الجذري.




بخربة التقطيع الخلوي عند Acetabularia










- انطلاقا من تحليلك لنتائج التجارب الممثلة في الوثيقتين 1 و 2، ماذا تستنتج بخصوص تموضع الخبر الوراثي؟
- باستغلالك نتيجة التجربة الممثلة في الوثيقة 3، مل ينطبق استنتاجك السابق علم الكائنات متعددة الخلايا كالعلجوم؟ علل إجابتك.

النشاط 2: كيفية انتقال الخبر الوراثي من خلية لأخرى

يتكون جسم الإنسان من ملايير الخلايا) 10¹⁴) وكل خلية تتوفر على نواة تحمل المادة الوراثية. أصل هذه الخلايا هو خلية بيضية، فهناك إذن انتقال للخبر الوراثي من خلية لأخرى أثناء تكاثرها. فكيف يتم انتقال الخبر الوراثي من خلية واحدة إلى ملايير الخلايا؟



غشاء سيتوبلازمي

جدار هیکلی

سيتوبلازم


غلاف نووي

جهاز غولجي حويصلات غولجية


الوثيقة 2 ملاحظة انقسام خلايا جذور الثوم

- مناولة:


- نضع قطع من جذر الثوم في أنبوب اختبار به الملون القرمزي الخلي carmin الذي يلون النواة بالأحمر الفاقع.
- نضع قطعةً واحدة بين صَفيحة و صُفَيحة ثم نلاحظ التحضير بالجهر الضوئي كما يبين ذلك الشكل 1 أسفله.



اا- مراحل الانقسام الخلوي:



الشكل 2



- من خلال معطيات الوثيقة 1، حدد مكونات النواة في حالة السكون.
- 2. انطلاقا من معطيات الوثيقة 2 (الشكل 1) وبالاعتماد على الوثيقة 1 استخرج التغيرات التي تحدث في الخلايا أثناء انقسامها وصف مظهر كل خلية من الخلايا a b c d واقترح ترتيبا لها.


التعليمات


صف مراحل الانقسام غير المباشر عند الخلايا النباتية الممثلة في الشكل 2.


النشاط 3: مراحل الانقسام الغير المباشر عند الخلية الحيوانية - مفهوم أولي للدورة الخلوية


خلال التكاثر الخلوي للخلايا النباتية تمر الخلايا من مرحلة السكون الى مرحلة الانقسام غير المباشر، هذا الأخير يتميز بالتوزيع المطابق للخبر الوراثي بين الخليتين البنتين فهل هذا ينطبق كذلك على الخلايا الحيوانية؟ وما مصير الخلايا بعد أن تنهي انقسامها؟


تمثل الأشكال أسفله رسوما تخطيطية لخلايا حيوانية في طور السكون و طور الانقسام الغير المباشر.
















تم تتبع حالة الصبغيات خلال مرحلتي السكون والانقسام غير المباشر لخلية أم وكذا للخليتين البنتين الناتجتين عن ذلك الانقسام، تمثل الوثيقة التالية رسوما لسلوك صبغي واحد من صبغيات الخلية الأم.

الوثيقة 2



 = G1
 = S
 = G2
 = P
 = M
 = A
 = T

- رتب المراحل التي تمثلها الأشكال المبينة في الوثيقة 1 مع تسمية ووصف كل مرحلة.
- انطلاقا من إجابتك على السؤال الأول وبالاستعانة بمعطيات الشكل 2 من الوثيقة 2 في النشاط 2، قارن الانقسام غير المباشر عند كل من الخلية .2 النباتية والخلية الحيوانية.
 - سم المراحل الممثلة في الوثيقة 2 مع وصف تطور الصبغيات خلال تلك المراحل واستنتج أهمية مرحلة السكون في التكاثر الخلوي. .3
 - تمثل مرحلة السكون ومرحلة الانقسام غير المباشر الذي يليها ما يسمى بالدورة الخلوية، وضح ذلك.


النشاط 4: الكشف عن الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية.

منذ اكتشاف الصبغيات وتتبع سلوكها خلال التكاثر الخلوي تم ربطها الخبر الوراثي باعتبارها الحامل له لكن لغز طبيعة الخبر الوراثي مازال غير معروف لأجل ذلك تم إنجاز عدة تجارب للكشف عن الطبيعة الكيميائية للخبر الوراثي كما توضح الوثائق التالية:

الوثيقة 1: تجربة Griffith (1928)

ارتكزت أبحاث Griffith على المكورات الرئوية Pneumocoques و هي نوع من البكتيريا تتسبب في إلتهاب الرئة و توجد على شكلين في الطبيعة: المكورات S تتوفر على محفظة و تُكَون عند زرعها لمات ملساء (S-Smooth). و المكورات R لا تتوفر على محفظة و تُكَون لمات خشنة (R=Rough).

أجرى Griffith مجموعة من التجارب على الفئران باستعمال هذه المكورات. ويلخص الجدول أسفله نتائج و ظروف هذه التجارب.



الوثيقة 2: تجربة Avery ومساعديه (1944)

جّارب Avery و مساعدوه

من أجل معرفة العلة الحولة قام Avery و مساعدوه باستخلاص مكونات المكورات S حيث وجدوا أنها تتكون من العناصر التالية:


- + ماء و مواد معدنية.
 - + مواد عضوية:

الوثيقة 3


- سكريات, دهنيات و بروتينات
- أحماض نووية (ADN: الحمض النووي الرببوزي ناقص الأوكسجين. ARN:
 الحمض النووي الرببوزي.)

قام Avery و مساعدوه بعد ذلك بعدة جّارب على المكورات S لمعرفة أي هذه العناصر مسؤول عن التحول البكتيري و ذلك باستعمال أنزيات محللة للمواد العضورة

ماذا تستنتج من خليلك لمعطيات و نتائج هذه التجربة؟



تعتبر الفيروسات (الحماة) متعضيات صغيرة جدا 0,5µm ط. فيليات إجبارية, الحماة التي تتط. فل على البكتيريا تسمى عاتيات Bactériophage. يمثل الشكل -أ- رسما تفسيريا لفوق بنية العاتية, الشكل -ب- صورة بالجهر الإلكتروني لعاتيات تتط. فل على بكتيريا, الشكل -ج- دورة حياة العاتيات.




- 1. حلل نتائج تجربة Griffith الممثلة في الوثيقة 1 واقترح فرضية لتفسير نتائجها.
- 2. انطلاقا من تحليل نتائج تجربة Avery الممثلة في الوثيقة 2، ماذا يمكن استنتاجه حول طبيعة العلة المحولة التي افترضها Griffith.
 - . هل تؤكد معطيات الوثيقة 3 ما استنتجته سابقا حول الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية؟ علل إجابتك.

النشاط 5: التركيب الكيميائي لجزيئة ADN وبنيتها

تشكل جزيئة ADN دعامة الخبر الوراثي فماهي المكونات الكيميائية لتلك الجزيئة؟ وماهي بنيتها؟


الوثيقة 1: المكونات الكيميانية لجزيئة ADN


أكتشف الـ ADN لأول مرة سنة 1869 من طرف العالم السويسري F. Miescher والذي أعطاه اسم nucléine, ثم تم خديد أنواع الجزيئات الكونة لها (الوثيقة جانبه) و قد بينت الدراسات أن هذه العناصر تتجمع في ADN مكونة بنية تسمى النكليوتيد (الشكل 4)




يعتبر النكليوتيد الوحدة البنيوية لـ ADN و يتميز بتركيبته الثلاثية التي هي أصل تسميتها بالحمض النووي الريبوزي الناقص الأكسجين Acide Désoxyribo Nucléique .

مف بنية النكليوتيد وحدد مختلف تركيباته المكنة





ئج



	الحاسات			
Т	С	G	Α	الحية
29,4	19,8	19,9	30,9	إنسان
29,2	21,5	20,5	28,8	دجاج
27.1	22.8	227	27 3	7 . 5

18,7

القواعد الأزوتية

32,9

17,1

يبين الجدول التائ	ية متنوعة.	خلايا كائنات ح	الـ ADNعند	الآزوتية بجزيئة	ة القولعد	حساب كميا	هذا الباحث ب	قام
							ىل عليها:	المحص

- 1- أحسب النسب A/T و G/C و (T+C)/(A+G) بالنسبة للإنسان و القمح و خلايا الخميرة.
 - 2- ماذا تستنتج؟

الوثيقة 3: بنبة جزيئة ADN

الوثيقة 2: نتائج تجارب Chargaff


3- ماذا تلاحظ بخصوص النسبة (G+C)/(G+C) ؟

تمكن M. Wilkins et R. Franklin سنة 1949 من الحصول على صورة لجزيئة ADN (الوثيقة أسفله) بتقنية حيود الأشعة ADN (الوثيقة أسفله) بتقنية حيود الأشعة مكن باستعمال هذه الصورة و نتائج الأبحاث السابقة تمكن العالمان F.CRICK و J.WATSON سنة 1953 من اقتراح نموذج تفسيري لبنية جزيئة ADN (الشكل جانبه). 1- انطلاقا من الوثيقة صف الشكل الهندسي لهذه

الجزيئة.







Extrémité Guanine

التعليمات

Extrémité 5'

- من خلال الوثيقة 1، صف المكونات الكيميائية لجزيئة ADN.
- 2. من خلال الوثيقة 2، احسب G/C و A/T بالنسبة لكل كائن حي. ماذا تستنتج بخصوص التوافقات الممكنة بين القواعد الأزوتية؟

Ryons >


ADN

انطلاقا من معطيات الوثيقة 3 والشريط الوثائقي، صف بنية جزيئة ADN.


النشاط 6: العلاقة بين الصبغيات، الصبغين والـADN

مكنت الأنشطة السابقة من الكشف عن دعامة الخبر الوراثي حيث تمثلت في البداية في كل من الصبغيات والصبغين لكن أخير تبين أن جزيئة ADN هي الدعامة الجزيئية للخبر الوراثي، فماهي العلاقة بين كل من الصبغيات، الصبغين وجزيئة ADN؟

الوثيقة 1: ملاحظة مجهرية لخلية ثم نواتها في مرحلة السكون.




الوثيقة 2: ملاحظة مجهرية لخلية في الطور الاستوائي من الانقسام غير المباشر حيث تم تمت معالجة صبغي استوائي بواسطة أنزيمات محللة للبروتينات (الشكلين 1 و 2) كما تمت إزالة تلولب الخييطات النووية المشكلة للصبغي (الشكلين 3 و 4). الشكل 5 يمثل نموذج تفسيري يوضح تحول الADN الى الصبغي.



- 1. باستغلالك معطيات الوثيقتين 1 و2، قارن مظهر المادة الوراثية خلال مرحلتي السكون والانقسام غير المباشر. واستنتج بنية وتركيب الصبغي.
 - 2. بالاستعانة بمعطيات الشكل 5 من الوثيقة 2، وضح العلاقة بين الصبغيات، الصبغين والـADN,

النشاط 7: الكشف آلية مضاعفة جزيئة ADN.

خلال التكاثر الخلوي يتم الحفاظ على الخبر الوراثي وذلك بتضاعف الصبغيات خلال مرحلة السكون ثم انقسامها في مرحلة الانقسام غير المباشر وبما أن الـADN هو المكون الأساسي للصبغيات فمضاعفة هذه الأخيرة تستلزم مضاعفة جزيئة ADN فكيف يمكن الكشف عن حدوث مضاعفة ADN وآليته؟



- 1. من خلال الوثيقة 1 سم المراحل المشار إليما بحروف على الوثيقة 1 واعط المدة الزمنية التقريبية للمراحل 1 M، J و C.
- 2. من خلال الوثيقة 1، صف تطور كمية ADN خلال الدورة الخلوية وانسب كل شكل من الأشكال من 1 ل 7 للمرحلة التي تناسبه.
 - 3. انطلاقا من معطيات الوثيقة 3، صف الفرضيتان اللتان تفسران كيفية مضاعفة ADN.

الجيل Go

4. تؤكد معطيات الوثيقة 3 أن مضاعفة تتم عبر آلية نصف محافظة. أبرز ذلك من خلال رسوم تخطيطا تفسر النتائج المحصلة في الأجيالG2 ، G1 و G3 منطلقا من الرسم الممثل في السبورة.

التعليمات


ذ. محمد اشباني

الجيل G₂


النشاط 7: آلية مضاعفة جزيئة ADN.

خلال مرحلة السكون تحدث مضاعفة ADN عبر آلية نصف محافظة فكيف تبدأ تلك العملية؟ وماهي العناصر المتدخلة فيها؟

الوثيقة 1 من أجل معرفة ما يحدث على مستوى النواة أثناء مرحلة مضاعفة ال ADN نعتمد على ملاحظة إلكترونوغرافية لنواة في هذه المرحلة ممثلة في الشكل -أ- ومثل الشكل -ب- رسما تفسيريا.



وثيقة 2 من أجل فهم دقيق لآلية مضاعفة ال ADN على مستوى عيون النسخ أنجزت عدة قجارب مكنت من وضع النموذج التفسيري للنسخ الجزيئي المثل في الشكل أسفله.



- انطلاقا من معطيات الوثيقة 1، صف كيفية انطلاقا مضاعفة جزيئة ADN.
- 2. بعد تسمية العناصر المرقمة في الوثيقة 2، حدد العناصر المتدخلة في مضاعفة ADN ودور كل واحد
 - 3. باستغلالك لمعطيات الوثيقتين 1 و 2، لخص بشكل واضح آلية مضاعفة ADN.