

التمرين (1) ليكن n عددا من \mathbb{N}

$$(1) \text{ بين أن : } \sin^{2n+1} x = \sum_{k=0}^{k=n} C_n^k (-1)^k \sin x \cos^{2k} x \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(2) \text{ أحسب } I_k = \int_{\frac{\pi}{2}}^x \sin t \cos^{2k} t \, dt \quad (\forall k \in \mathbb{N})$$

$$(3) \text{ استنتج التكامل : } I = \int_{\frac{\pi}{2}}^x \sin^{2n+1} t \, dt$$

التمرين (2) ليكن n عدد طبيعي غير منعدم نضع $U_n = \int_0^1 \frac{x^{2n}}{1+x^2} dx$ و $U_0 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

(1) أحسب U_0

$$(2) \text{ بين أن } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad U_{n+1} + U_n = \frac{1}{2n+1}$$

$$(3) \text{ بين أن } (\forall n \in \mathbb{N}^*) \quad 0 < U_n < \frac{1}{2n+1} \text{ ثم حدد } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$$

$$(4) \text{ نعتبر المتتالية } (V_n)_n \text{ المعرفة بما يلي : } V_n = \sum_{k=0}^{k=n} \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

$$\text{أ. بين أن } (\forall n \in \mathbb{N}) \quad \sum_{k=0}^{k=n} (-1)^k x^{2k} = \frac{1 + (-1)^n x^{2n+2}}{1+x^2}$$

$$\text{ب. استنتج أن المتتالية } (V_n)_n \text{ متقاربة وأن } \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \frac{\pi}{4}$$

التمرين (3) (I) نعتبر الدالة العددية f بحيث : $f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$

$$(1) \text{ أ. أحسب النهايتين } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

ب. أدرس الفرع اللانهائي للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

$$(2) \text{ أحسب } f'(x) \text{ و أدرس منحنى تعبيرات الدالة } f$$

$$(3) \text{ أرسم المنحنى } (C_f)$$

(II) لتكن F الدالة العددية المعرفة على \mathbb{R} بما يلي : $F(x) = \int_0^x f(t) dt$

$$(1) \text{ أ. بين أن } (\forall x > 0) \quad (\forall t \in [0, x]) \quad f(t) \geq \frac{e^t}{1+x^2}$$

$$\text{ب. استنتج أن } (\forall x > 0) \quad F(x) \geq f(x) - \frac{1}{1+x^2} \text{ ثم أحسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$$

ج. أدرس الفرع اللانهائي للمنحنى (Γ_F) عند $+\infty$

(2) بين أن F تزايدية قطعاً على \mathbb{R}

$$(3) \text{ أ. بين أن } (\forall x < 0) \quad F(x) \geq \arctan x$$

ب. نقبل أن F تقبل نهاية l عند $-\infty$. بين أن $-\frac{\pi}{2} \leq l \leq 0$