

التمرين الأول :

نعتبر الدالة العدية f المعرفة بما يلي : $f(x) = x \arctan x$

(I) 1 أ- أدرس زوجية الدالة f

ب- أحسب النهاية $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و أدرس الفرع اللانهائي للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

(2) أحسب المشتقة $f'(x)$ و بين أن f تزايدية قطعاً على المجال $[0, +\infty[$

(3) أرسم المنحنى (C_f)

(II) 1 حل في \mathbb{R}^+ المتراجحة $f(x) > x$

(2) نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة بما يلي : $U_0 = \sqrt{3}$ و $U_{n+1} = f(U_n)$

أ- بين أن $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n \geq \sqrt{3}$ (نعطي $\tan(1) \approx 1,56$)

ب- بين أن $\forall n \in \mathbb{N} \quad \frac{U_{n+1}}{U_n} \geq \frac{\pi}{3}$ و استنتج أن $(U_n)_n$ تزايدية

ج- بين أن $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n \geq \left(\frac{\pi}{3}\right)^n \sqrt{3}$ و حدد $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

(III) 1 بين أن المعادلة $f(x) = \frac{\pi n}{4n+1}$ تقبل في المجال $[0, +\infty[$ حلاً وحيداً x_n

(2) أدرس رتبة المتتالية $(x_n)_n$

(3) بين أن $\forall n \in \mathbb{N} \quad x_n < 1$ و استنتج أن $(x_n)_n$ متقاربة و حدد نهايتها

التمرين الثاني :

ليكن n عدد طبيعي بحيث $n > 2$.

نعتبر الدالة f_n المعرفة على $[0, +\infty[$ بما يلي : $f_n(x) = x^n - 2 - n(x-1)$

(1) أدرس رتبة الدالة f_n

(2) بين أن المعادلة $f_n(x) = 0$ تقبل حلين a_n و b_n مع $0 < a_n < 1 < b_n$

(3) أ- أدرس إشارة الفرق $f_{n+1}(x) - f_n(x)$

ب- استنتج رتبة المتتالية كل من المتتاليتين $(a_n)_n$ و $(b_n)_n$

(4) بين أن $\forall n > 2 \quad \frac{-2}{n} < a_n - 1 < \frac{-1}{n}$ و استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$

(5) أ- بين أن $(\forall x > 0) (\forall n > 2) (1+x)^n \geq 1 + nx + C_n^2 x^2$

ب- استنتج إشارة $f_n\left(1 + \frac{2}{n}\right)$ ثم أن $(b_n)_n$ متقاربة و حدد نهايتها

بين أن $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2 + n}) = 1$