



انتشار موجة ضوئية Propagation d'une onde lumineux


I – الإبراز التجريبي لظاهرة حيود الضوء

1 – تجربة

- ننجز التركيب التجريبي جانبه حيث :
- الحزمة الضوئية المنبعثة من جهاز الليزر تقع في وسط الورق الميليمترى .
 - نضع صفيحة بها شق عرضه a على مسافة $D=1,77\text{m}$ من الشاشة ، فنشاهد على هذه الأخيرة الشكل أ .



الشكل ب



الشكل أ



- نعرض الصفيحة بأخرى شقها عرضه $a/2$ فتحصل على الشكل ب
- نحتفظ بنفس المسافة $D=1,77\text{m}$ ونستعمل صفائح شقوقة مختلفة العرض a . نقيس بالنسبة لكل صفيحة العرض L للبقع المركزية المشاهدة على الشاشة .
- ندون في جدول قيم كل من a و L . فتحصل على الجدول التالي :

$a(\mu\text{m})$	380	250	110	90	50
$L(\text{mm})$	5,5	8,5	2,0	2,5	3,0

استثمار

1

الماء

- ظاهرة حيود الموجات الميكانيكية تحدث عندما من طول الموجة الميكانيكية . نفس الشيء بالنسبة للضوء فعند وصوله إلى حاجز ذي فتحة عرضها a صغير جدا يتغير اتجah انتشار الأشعة الضوئية .

- 2 – ذكر بالمبدأ المستقيم للضوء . هل يتحقق هذا المبدأ خلال هذه التجربة ؟ ينتشر الضوء في أوساط شفافة ومتاجنة وفق خطوط مستقيمة .

عند وصول الضوء إلى الحاجز ذي الفتحة يتغير اتجاه انتشاره وبالتالي فإن مبدأ انتشار الضوء لا يتحقق . لـت هذه الأشعة الضوئية يمكنها أن تصل إلى أماكن توجد وراء الحاجز . نقول أن الضوء خضع لظاهرة الحيود عند حدوث

، وتقل شدة إضاءتها كلما ابتعدنا عن المركز ويتصـرف هنا الشق كمنبع ضوئي وهـمـي

3 – ماـذا يمكن استـخلـاصـه فـيـما يـخـص طـبـيـعـة الضـوـء ؟
مـبـداـاـ الـإـنـتـشـارـ الـمـسـتـقـيمـيـ لـلـضـوـءـ لـاـ يـمـكـنـ منـ تـفـسـيرـ وـصـولـ الضـوـءـ لـأـمـاـ وـبـالـمـمـاثـلـةـ مـعـ الـمـوـجـاتـ الـمـيـكـانـيـكـيـةـ نـعـتـبـرـ الضـوـءـ مـوـجـةـ .
خـلاـصـةـ :

كـمـاـ هـوـ الشـأـنـ بـالـنـسـبـةـ لـحـيـودـ مـوـجـةـ مـيـكـانـيـكـيـةـ مـسـتـقـيمـيـةـ عـلـىـ سـطـحـ المـاءـ فـيـ حـوـضـ الـمـوـجـاتـ ،ـ يـتـمـ حـيـودـ الضـوـءـ ،ـ بـوـاسـطـةـ فـنـحـاتـ صـغـيرـةـ :ـ ثـقـبـ أـوـ شـقـ رـأـسيـ أـوـ سـجـافـ voilageـ وـالـتـيـ يـمـكـنـ اـعـتـبـارـهـاـ مـنـابـعـ ضـوـئـيـةـ وـهـمـيـةـ ،ـ الشـيـءـ الـذـيـ يـثـبـتـ

الـفـرـضـيـةـ التـالـيـةـ :

إنـ الضـوـءـ عـبـارـةـ عـنـ مـوـجـاتـ مـتـوـالـيـةـ .ـ وـيـسـمـيـ هـذـاـ الـمـظـهـرـ الـمـوـجـيـ لـلـضـوـءـ .ـ

ولـقدـ توـصـلـ العـالـمـ هوـيـكـنـسـ Huygnesـ إـلـىـ هـذـهـ الـفـرـضـيـةـ فـيـ مـنـتـصـفـ الـقـرـنـ السـابـعـ عـشـرـ المـيـلـادـيـ وـثـمـ إـثـبـاتـهـاـ تـجـريـبـيـاـ فـيـ بـدـاـيـةـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ المـيـلـادـيـ مـنـ طـرـفـ الـعـالـمـ يـونـغـ Youngـ

4 – تحـديـدـ طـوـلـ الـمـوـجـةـ لـمـوـجـةـ ضـوـئـيـةـ مـنـبعـتـةـ مـنـ جـهاـزـ الـلـازـرـ .ـ

ـ يـرـمزـ لـلـفـرـقـ الزـاوـيـ بـيـنـ وـسـطـ الـبـقـعـةـ الـمـركـزـيـةـ وـأـوـلـ بـقـعـةـ مـظـلـمـةـ بـالـحـرـفـ θـ .ـ

ـ 4ـ 1ـ بـالـنـسـبـةـ لـفـرـقـ زـاوـيـ صـغـيرـ ،ـ يـمـكـنـ كـتـابـةـ الـعـلـاقـةـ $\tan\theta = \theta$ ـ ،ـ حـيـثـ يـعـبـرـ عـنـ θـ بـالـرـدـيـانـ .ـ

$$\text{أثبت العلاقة : } \theta = \frac{L}{2D}$$

نـعـبـرـ عـنـ الـفـرـقـ الزـاوـيـ θـ بـالـرـدـيـانـ بـيـنـ وـسـطـ الـهـذـبـ الـمـركـزـيـ وـأـوـلـ هـذـبـ مـظـلـمـ

منـ خـلـالـ الشـكـلـ لـدـيـنـاـ :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{L}{2D}$$

بـاعـتـبـارـ أـنـ θـ صـغـيرـ جـداـ فـإـنـ

$$\tan\theta \approx \theta = \frac{L}{2D}$$


ـ 2ـ مـثـلـ الـمـنـحـنـىـ الـمـمـثـلـ لـتـغـيـرـاتـ θـ بـدـلـالـةـ $\frac{1}{a}$ ـ

$a(\mu\text{m})$	380	250	110	90	50
$L(\text{m})$	$5,5 \cdot 10^{-3}$	$8,5 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$2,5 \cdot 10^{-2}$	$3,0 \cdot 10^{-2}$
$1/a(\text{m}^{-1})$	$2,6 \cdot 10^3$	$4,0 \cdot 10^3$	$9,1 \cdot 10^3$	$1,1 \cdot 10^4$	$2,0 \cdot 10^4$
$\theta(\text{rad})$	$1,55 \cdot 10^{-3}$	$2,40 \cdot 10^{-3}$	$0,56 \cdot 10^{-2}$	$0,71 \cdot 10^{-2}$	$0,85 \cdot 10^{-2}$

الـتمـثـيلـ الـمـبـيـانـيـ بـاخـتـيـارـ السـلـمـ التـالـيـ :

بالـنـسـبـةـ لـ $1/a$ ـ نـخـتـارـ :ـ $1\text{cm} \leftrightarrow 0,5 \cdot 10^4 \text{m}^{-1}$

بالـنـسـبـةـ لـ θ ـ نـخـتـارـ :ـ $1\text{cm} \leftrightarrow 1,10^{-3} \text{rad}$



4 - 3 أستنتج العلاقة الرياضية بين θ و $(1/a)$. ما هو المدلول الفيزيائي للمعامل الموجة للمنحنى المحصل عليه ؟

$$\theta = k \cdot \frac{1}{a}$$

أن الثابتة k تمثل طول الموجة لأن وحدتها في المعادلة هي المتر . وبالتالي فالعلاقة بين θ و $(1/a)$ هي :

5 - ما تأثير عرض الشق a على العرض L للبقةعه المركبة ؟

II - الموجات الضوئية

1 - انتشار الموجات الضوئية

الضوء الطبيعي المنبعث من الشمس يحتاج لوسط مادي لانتشاره خلافاً للموجات الميكانيكية .

تنتشر الموجات الضوئية في الفراغ .

في سنة 1821 نشر فرييل Fresnel فرضيته بالنسبة للإهتزازات الضوئية باعتبارها موجات مستعرضة أي أنها متعمدة مع اتجاه انتشارها . بحيث أن هذه الاشارة هي عبارة عن مجال كهربائي مقرر في مجال مغناطيسي لذا نسميه بالموجات الكهرومغناطيسية .

الموجات الضوئية موجات كهرومغناطيسية .

تنشر في الفراغ بسرعة $c \approx 3.10^8 \text{ m/s}$

سرعة انتشار الضوء في الفراغ هي ثابتة عالمية قيمتها $c=299\ 792\ 458 \text{ m/s}$ في وسط مادي شفاف سرعة الضوء أصغر من سرعته في الفراغ . في الهواء تقارب سرعته في الفراغ .

تحمل الموجات الضوئية طاقة تسمى طاقة الإشعاع .

2 - العلاقة بين طول الموجة الضوئية والتردد


تتميز موجة ضوئية أحادية اللون بترددتها v ، تعبر عنه بالهرتز (Hz) أو بالدور $T = \frac{1}{v}$ تعبر عنها بالثانية (s) .


- تردد موجة ضوئية هي نفسها في جميع الأوساط الشفافة .
- طول الموجة λ في الفراغ يمثل الدورية المكانية و T تعبر عن الدورية الزمنية . هذان المقداران مرتبان بالعلاقة التالية :

$$\lambda = c \cdot T$$

نعبر عن λ بالметр (m) و عن c ب (m/s) و v ب الثانية (s) .

يبين الجدول التالي مجال الترددات وطول الموجة للموجات الضوئية في الفراغ :





III – تبدد الضوء

III – 1 سرعة الانتشار ومعامل الانكسار

تعريف : معامل انكسار وسط شفاف هو النسبة بين سرعة الانتشار c للضوء في الفراغ وسرعة انتشاره v في هذا الوسط الشفاف .

$$n = \frac{c}{v}$$

معامل الانكسار ليس له وحدة . في الهواء كل الإشعاعات تنتشر بسرعة v تقارب c وبالتالي فمعامل انكسار الهواء يقارب 1 : $n_{\text{air}} = 1,00$

في الماء ، تساوي سرعة الضوء تقريبا $2,3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ أي أن معامل الانكسار الماء هو :

$$n_{\text{eau}} = 1,3$$

III – 2 معامل الانكسار وطول الموجة

طول الموجة λ لإشعاع تردد v هو :

في وسط شفاف مبدد معامل انكساره $n = \frac{c}{v}$ ، الإشعاع

ذى التردد v طول موجته λ نعبر عنها بالعلاقة التالية :


$$\lambda = \frac{c}{n \cdot v} \text{ حسب العلاقة السابقة}$$

$$\lambda = \frac{\lambda_{\text{vide}}}{n} \Rightarrow n = \frac{\lambda_{\text{vide}}}{\lambda}$$

III – 3 تعدد الضوء بواسطة موشور

تعريف بالموشور :

الموشور وسط شفاف محدود بوجهين مستويين غير متوازيين ، يتقطعان حسب مستقيم



يسمى حرف الموشور مستوى المقطع الرأسى هو المستوى

- المتعامد مع الحرف

- قاعدة الموشور هي الوجه المقابل للحرف

- زاوية الموشور هي الزاوية A المقابلة لقاعدة .

تجربة : تحليل الضوء الأبيض

أنظر هذا الرابط بالإنترنت


[http://www.up.univ-](http://www.up.univ-mrs.fr/~laugierj/CabriJava/0pjava60.html)

[mrs.fr/~laugierj/CabriJava/0pjava60.html](http://www.up.univ-mrs.fr/~laugierj/CabriJava/0pjava60.html)

نضع أمام منبع ضوئي (S) ، حجابا به شق رقيق جدا ونحقق بواسطة عدسة رقيقة مجمعة ،

على شاشة E ، صورة الشق ، ثم نضع بين العدسة والشاشة ، موشورا من زجاج شفاف .
ملاحظات :

- انحراف الحزمة الضوئية بسبب وجود الموشور الأولى عند دخولها الموشور والثانية عند خروجها منه .
- نلاحظ على الشاشة E بقعة ضوئية ملونة وهذه الألوان مشابهة لأنواع قوس قزح ، تسمى هذه البقعة الضوئية الملونة بـ **طيف الضوء الأبيض**
- عند استعمال ضوء أحادي اللون (الأحمر) نلاحظ على الشاشة طيف ضوئي يضم حزة واحدة
- يعطي الضوء الأبيض طيف ضوئي مستمر
- الزجاج وسط مبدل للضوء حيث معامل الانكسار يتعلق بتردد الاشعاعات الضوئية



التحليل

أ - انحراف الضوء الأحادي اللون :
يرد شعاع ضوئي أحادي اللون ينتمي إلى المقطع الرأسى على وجه الموشور .

1 - ما هي الظاهرة التي تحدث عند دخوله الموشور ، ثم عند خروجه منه ؟

- تحدث ظاهرة الانكسار مرتين : عنطر دخوله في النقطة I ، ثم عند خروجه في النقطة 'I' .

2 - حدد على الشكل زاوية الانحراف D بين شعاع الوارد على الموشور والشعاع المنبعث عند خروجه I'R منه : $D = \boxed{SI, I'R}$

- الشعاعان SI و I'R ليس لهما نفس الاتجاه وبالتالي فعن الموشور قد غير اتجاه الضوء الأحادي اللون / تسمى هذه الظاهرة انحراف الضوء بواسطة موشور .

تعريف : زاوية الانحراف D هي الزاوية التي يكونها اتجاه الشعاع الوارد SI مع اتجاه

الشعاع المنبعث I'R أي $D = \boxed{SI, I'R}$

3 - أوجد هندسيا وتطبيقي قوانين ديكارت للانكسار صيغ الموشور .

حسب قوانين ديكارت للإنكسار لدينا :

$$\sin i = n \sin r$$

$$n \sin r' = \sin i'$$


هندسيا لدينا : حسب المثلث AII

$$\boxed{A} + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right) = \pi \Rightarrow \boxed{A} = r + r'$$

نأخذ زاوي المثلث AJE و AJI

$$\boxed{A} + \left(\frac{\pi}{2} - i'\right) + \left(\pi - \frac{\pi}{2} - i + D\right) = \pi \Rightarrow \boxed{A} - i' - i + D = 0$$

$$D = i + i' - \boxed{A}$$



انظر الرابط بالأإنترنيت التالي :

<http://perso.orange.fr/guy.chaumeton/animations/2dprisme1.htm>

3 – ظاهرة تبدد الضوء

نرسل حزمة رقيقة من الضوء الأبيض على موشور كما هو ممثل في الشكل ونعتبر العلاقة :

$$D = i + i' - A$$

نلاحظ :

بالنسبة للإشعاعات التي تكون الضوء الأبيض أن كلًا من الزاويتين i و A لهما نفس القيمة ، بينما قيمة الزاويتين i' و D مرتبطةان بقيمة معامل الانكسار n أي طول موجة الاشعاع أي لون هذا الأخير .

$$\sin i = n \sin r$$

$$n \sin r' = \sin i'$$

مما يبين أن معامل انكسار زجاج الموشور يتعلق بتردد الموجات الضوئية وبما أن $n = \frac{C}{V}$

فإن سرعة انتشار الموجات تتبع ذلك بتردد الموجات وهذا يبين أن زجاج الموشور مبدد للضوء

بالنسبة لمنحنى الانحراف D ، فإنه يكبر من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي أي الضوء الأحمر أقل انحرافا بينما الضوء البنفسجي أكثر انحرافا .

خلاصة :

يتعلق معامل انكسار وسط شفاف بتردد إشعاعات الضوئية ، وهذا ما يسبب ظاهرة تبدد الضوء ملحوظة :

تتميز الموجة الضوئية بطول موجتها لكون أن طول الموجة يتغير عندما تنتقل من وسط إلى آخر $n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ (طول الموجة الضوئية يتعلق بمعامل الانكسار) بينما ، التردد يبقى هو نفسه . فالذي

يتغير من وسط إلى آخر هو سرعة انتشار الضوء

$$\frac{\sin i_1}{\sin i_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$