

الصفحة 1 4	<p style="text-align: center;">الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية - خيار فرنسية الدورة الاستدراكية 2018 -عناصر الإجابة-</p>	<p style="text-align: center;">+XNΛε+ I NCYOCΘ +eC:LJLθ+ I 8OXEε εLεE3O Λ 8OCε+X εJЖ#HεL Λ 8OΘHCΛ εLεXHHε Λ 8OЖЖε εLεOΘεL</p> <p style="text-align: center;">المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي</p> <p style="text-align: center;">المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه</p>
★★★	RR32F	

3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية : مسلك علوم الحياة والأرض - خيار فرنسية	الشعبة أو المسلك

Question	Les éléments de réponse	Note
Première partie (5 pts)		
I	(1, d) ; (2, c) ; (3, c) ; (4, a)	0.5x4
II	<p>Définitions (accepter toute définition correcte comme) :</p> <p>1. L'anatexie : Processus de fusion partielle des roches métamorphiques à l'origine d'un magma.</p> <p>2. Le faciès métamorphique : Ensemble de minéraux stable dans un intervalle de P et T (accepter aussi : Intervalle de P et T dans lequel un ensemble de minéraux index sont stable).</p>	0.5 0.5
III	a-faux ; b-vrai ; c-faux ; d-faux	0.25x4
IV	<p>1. Caractéristiques des chaînes de collision (accepter 2 caractéristiques parmi) : Epaissement crustale ; métamorphisme thermodynamique ; déformations tectoniques, suture ophiolitique,</p> <p>2. Caractéristiques des chaînes d'obduction: (accepter 2 caractéristiques parmi) Les ophiolites ; déformations tectoniques (les nappes de charriages; les failles inverses ; les plis-failles ;les plis.</p>	0.5 0.5
Deuxième partie (15 pts)		
Exercice 1 (3 pts)		
1	<p>Description :</p> <p>Figure a :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant l'introduction du pyruvate, on constate une stabilité de la concentration d'O₂ à une valeur de 100UA et la concentration en ATP à une valeur de 30 UA. - Après l'introduction du pyruvate, la concentration d'O₂ diminue jusqu'à atteindre une valeur d'environ 35UA, en même temps la concentration de l'ATP augmente jusqu'à 100UA. - Après l'épuisement du pyruvate les concentrations d'O₂ et d'ATP restent stables à une valeur de 35UA pour l'O₂ et 100UA pour l'ATP..... <p>Figure b :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant t₁ la concentration d'O₂ reste stable dans une valeur proche de 100% ; - Suite à l'ajout du pyruvate en t₁ la concentration d'O₂ diminue pour atteindre une valeur proche de 40 UA. -Après l'ajout de l'Antimycine-A en t₂ la concentration d'O₂ se stabilise dans la une valeur proche de 40 UA..... <p>Hypothèse : (accepter toute hypothèse valable pour expliquer la relation entre l'Antimycine-A et la production d'ATP).</p> <p>Exemple :L'Antimycine-A inhibe les réactions d'oxydations respiratoires mitochondriales permettant la production d'ATP.</p>	0.5 0.5 0.5

2	<p>a. Les électrons se déplacent à travers les complexes de la chaîne respiratoire dans le sens des potentiels Redox croissants.....</p> <p>b. L'Antimycine-A inhibe le complexe III de la chaîne respiratoire et empêche le transfert des électrons vers le récepteur final O₂ qui n'est plus réduit en H₂O (pas de consommation d'O₂).....</p>	0.25 0.5
3	<p>Explication : En présence d'Antimycine-A → inhibition du flux des électrons au niveau de la chaîne respiratoire → arrêt du pompage des protons H⁺ de la matrice vers l'espace intermembranaire → pas de formation du gradient de protons → pas de retour des protons vers la matrice → pas de synthèse d'ATP.....</p>	0.75
Exercice 2 (5 pts)		
1	<p>Modifications produits en passant de l'interphase à la prophase :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au niveau cytoplasmique : migration des centrosomes vers les deux pôles opposés de la cellule, formation du faisceau achromatique... - Au niveau nucléaire : fragmentation de l'enveloppe nucléaire, disparition du nucléole, condensation de la chromatine en chromosomes individualisés... 	1
2	<p>Comparaison :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protéine lamine A : normale chez la personne saine et anormale chez la personne malade. - Disposition des lamines A sur la membrane nucléaire : ordonnée chez la personne saine et désordonnée chez la personne malade. - Structure du noyau : normale chez la personne saine et déformée chez la personne malade. - Phénotype : division normale des cellules avec réparation et renouvellement des tissus chez la personne saine et division anormale des cellules avec altération de la réparation et du renouvellement des tissus chez la personne malade (vieillesse précoce) <p>Relation protéine caractère : toute modification de la protéine (Lamine A) entraîne une modification des caractères (divisions cellulaires) d'où la relation protéine caractère.....</p>	0.25×4 0.5
3	<p>Séquences de l'ARNm et des acides aminés correspondant à chacun des fragments des allèles LMNA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chez le sujet sain ARNm : GUG GCC AAG CUU GAG GCA GCC CUA GGU Peptide : val – Ala – Lys – Leu – Ac.glu – Ala – Ala – leu – Gly - Chez le sujet malade ARNm : GGG CCA AGC UUG AGG CAG CCC UAG GU Peptide: Gly– Pro–Ser –Leu–Arg – Gln– Pro. <p>Relation gène-protéine: La mutation par délétion du nucléotide A au niveau du triplet 169 d'ADN a changé le cadre de lecture → synthèse d'ARNm modifié par rapport à l'ARNm normal → synthèse d'une chaîne peptidique courte → protéine lamine A altéré → apparition de la maladie.</p>	0.25×2 0.25×2 0.5

4	<p>Le facteur des variations agissant sur la population des escargots : la sélection naturelle.</p> <p>Explication :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dans la forêt : milieu homogène → camouflage des escargots à coquille sans bandes par contre les escargots avec bandes sont plus visibles → les escargots à coquille avec bandes sont plus exposés à la prédation que ceux qui sont sans bandes. • Dans la prairie : milieu hétérogène → camouflage des escargots à coquille avec bandes par contre les escargots à coquilles sans bandes sont plus visibles → les escargots à coquille sans bandes sont plus exposés à la prédation que ceux qui sont avec bandes. 	0.25
		0.75
Exercice 4 (3 pts)		
1	<p>Description :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre la 6^{ème} et la 12^{ème} semaine : diminution du nombre des virus dans le sang passant de 10⁷/mL à 10³/mL, avec augmentation du nombre des lymphocytes T4 dans le sang qui passe de 400/μL à plus de 800/μL . - Pendant la phase de sida déclaré le nombre de virus augmente de 10³/mL à 10⁷/mL, alors que le nombre des lymphocytes T4 dans le sang diminue de 400 lymphocytes T4 /μL du sang pour s'annuler à la fin de cette phase..... <p>Explication :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre la 6^{ème} et la 12^{ème} semaine on explique la diminution du nombre de virus dans le sang par le déclenchement d'une réponse immunitaire spécifique (augmentation du nombre des LT4 et apparition des anticorps spécifique). - Pendant la phase de sida déclaré on explique l'augmentation du nombre des virus par une déficience immunitaire suite à la chute des lymphocytes T4 qui sont détruites par la prolifération virale..... 	0.5
2	<p>- Condition nécessaire au déroulement d'une réponse immunitaire efficace : La coopération entre les trois types de lymphocytes T4, T8 et B.....</p> <p>- Justification : car en présence de ces trois types de cellules (lot 1) toutes les souris restent en vie et l'élimination des virus se fait plus rapidement en comparaison avec les autres lots.....</p>	0.25
		0.25
3	<p>Description :</p> <p>Document 3 : pour des concentrations d'interleukines entre 10 et 10² UA on a une faible augmentation du nombre des plasmocytes ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour des concentrations d'interleukines au-delà de 10² UA on a une augmentation rapide du nombre des plasmocytes qui atteint 1000 à une concentration de 10⁴ UA d'interleukine 2..... <p>Document 4 : Avant l'injection du virus le nombre des lymphocytes T8 dans la rate des souris mutées est 15.10⁶ est égale à celui des souris normales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 jour après l'infection, le nombre des lymphocytes T8 dans la rate des souris mutées reste constant contrairement aux souris normales chez lesquelles on note une augmentation du nombre des lymphocytes T8 qui atteint environ 44.10⁶ lymphocytes T8 dans la rate. <p>Déduction : l'interleukine-2 stimule la multiplication des lymphocytes T8 et augmente le nombre des plasmocytes</p>	0.25
		0.25
4	Un schéma explicatif qui illustre le rôle central du LT4 dans le déroulement de la réponse immunitaire.	0.75